

## 주의 및 추가

**연습문제 0.** 표지 그림은 LCG (Linear Congruence Generator) 를 이용하여 만들어졌다. 즉,  $x_1 = 1015568748$  에서 시작하여

$$x_{n+1} \equiv ax_n + b \pmod{N}$$

을 이용하여 (보기 12.2.8의 표기법 참조),  $x_2, x_3, \dots$  를 구한 후 모두 10-digit 의 수로 나타낸 것이다. 따라서, 각 row 에는 각각 5 개의 10-digit 의 수가 있다. 예를 들어,  $x_2 = 1586005467$  이고,  $x_{21} = 0927463856$  이다 ( $x_{21}$  은 실제로는 9 자리 수). **이때, 자연수  $a, b$  와  $N$  을 구하라.**

**주의 1.** 이 책에서 [최초의 1]은 항상 정의 1.2.2에 있는 의미로 사용된다. 따라서, 정리 4.4.4의 증명이나 보기 5.4.14 등의 [최초의 1을 포함하는 column]의 표현도 정의 1.2.2에 있는 의미로 받아들여야 한다. 예를 들어, 연습문제 1.2.1(나)항의  $(4 \times 7)$ -행렬에서  $(1, 2)$ -성분의 1은 [최초의 1]이 아니고, 따라서 이 행렬의 second column은 [최초의 1을 포함하는 column]이 아니다.

**추가 2.** 관찰 2.1.7 다음에 추가:  $[0 \neq a \in F, 0 \neq v \in V$  이면,  $av \neq 0]$ .

**주의 3.** 주의 3.2.5는 여전히 미묘하다. 이는  $\{a, b\} = \{a, a, b\}$  이므로 생기는 피할 수 없는 문제이다. 우리가 “집합  $S$ 가 일차종속(일차독립)”이라고 말할 때에는  $S$ 의 한 원소를 두 번 이상 ‘쓰지’ 않는 것으로 이해해야 한다. 만약 이 원칙이 없다면 집합  $S$ 의 일차종속(일차독립) 여부를 판정할 수 없을 것이다. 물론 집합을 원소나열법으로 나타낼 때는 주의 3.2.5의 원칙을 따른다.

**추가 4.** 정리 5.3.5(선형대수학의 기본정리)에서 함수  $\Phi_{\mathcal{L}}^{\text{ob}} : \mathfrak{M}_{m,n}(F) \rightarrow \mathfrak{L}(V, W)$ 가 well-defined되어 있는지 설명이 필요. 즉,  $A \in \mathfrak{M}_{m,n}(F)$ 일 때,  $\Phi_{\mathcal{L}}^{\text{ob}}(A) \in \mathfrak{L}(V, W)$ 인지 확인하여야 한다.

**추가 5.** §5.4에 **Rank Theorem**의 새 증명 추가:  $A \in \mathfrak{M}_{m,n}(F)$ 일 때,  $UA = R$ 을  $A$ 의 row-reduced echelon form이라고 하자(단,  $U \in \mathfrak{M}_{m,m}(F)$ 는 가역). 그러면,  $A$ 와  $R$ 의 row rank는 같다(따름정리 4.4.7). 한편,  $L_U$ 는 isomorphism이므로,  $A$ 와  $R$ 의 column rank도 같다(왜 그런가?). 이제 행 간소 사다리꼴의 row rank와 column rank는 당연히 같으므로, 증명 끝.

**주의 6.** 보기 5.4.13의 행렬  $A = (a_{ij})$ 에서,  $a_{ij}$ 들은 명제 3.3.11에 정의되어 있음.

**추가 7.** 연습문제 5.5.9에 추가:  $[\alpha_{\mathfrak{B}}^{\mathcal{E}} = L_P, \alpha_{\mathcal{F}}^{\mathcal{C}} = L_Q]$ .

**추가 8.** §5.6에 **row-reduced echelon form**의 **uniqueness** 새 증명 추가: Elementary row operation은 row space를 변화시키지 않으므로, 아래 보조정리에 의해 당연.

**보조정리**  $R, S \in \mathfrak{M}_{m,n}(F)$ 가 row-reduced echelon form 이고,  $R$ 의 row space와  $S$ 의 row space가 같으면,  $R = S$ .

**증명:** 우선, row-reduced echelon form의 일반적인 모습은 다음과 같다:

$$[L_A]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{C}} = \begin{matrix} & k_1 & & k_2 & & k_3 & & & \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & \\ \begin{pmatrix} \mathbf{0} & 1 & * & 0 & * & 0 & * & \cdots \\ \mathbf{0} & 0 & \mathbf{0} & 1 & * & 0 & * & \cdots \\ \mathbf{0} & 0 & \mathbf{0} & 0 & \mathbf{0} & 1 & * & \cdots \\ \mathbf{0} & 0 & \mathbf{0} & 0 & \mathbf{0} & 0 & \mathbf{0} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ \mathbf{0} & 0 & \mathbf{0} & 0 & \mathbf{0} & 0 & \mathbf{0} & \cdots \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

위 행렬에서, 굵은  $\mathbf{0}$ 이나  $*$ 는 여러 column을 계속할 수도 있다는(없을 수도 있고) 뜻이고,  $*$ 는 무언가(zero 이건 non-zero 이건) 있다는 뜻이다. 물론  $k_1, \dots, k_r$ 은 [최초의 1]을 갖는 column의 위치를 나타낸다.

[Step 1] Row space가 같으면, 그의 dimension(즉, row rank)도 같다. 그리고 row-reduced echelon form의 row rank는 당연히 [최초의 1]의 개수와 같다. 이제  $R, S$ 의 (공통의) row rank를  $r$ 로 표기하자.<sup>1</sup>

[Step 2]  $R, S$ 의 첫 번째 row의 [최초의 1]의 위치(즉, 위 행렬의  $k_1$ )는 같다. 왜냐하면,  $k_1$ 은  $R, S$ 의 row space에 속하는 vector들의 첫 번째 non-zero 좌표이기 때문이다.

[Step 3] 위 행렬에서 첫 번째 row를 제거해도 row-reduced echelon form이 남는다.<sup>2</sup> 뿐만 아니라,  $R, S$ 의 첫 번째 row를 제거한 두 행렬도 여전히 같은 row space를 갖는다. 이를 증명하려면,  $2 \leq i \leq r$ 일 때,  $[R]_i \in \langle [S]_2, \dots, [S]_r \rangle$ 임을 보이면 된다(왜 그런가?). 그런데

<sup>1</sup>만약  $r = 0$ 이면,  $R = S = 0$ 이므로,  $r > 0$ 이라고 가정하자.

<sup>2</sup>물론  $m > 1$ 일 때.

$$[R]_i = a_1[S]_1 + a_2[S]_2 + \cdots + a_r[S]_r$$

인  $a_1, \dots, a_r \in F$ 가 존재하고, 이 식 양변의  $k_1$ -좌표를 비교하면,  $0 = a_1$ 임을 알 수 있다. 앞 [Step 2]에 의해,  $[R]_i$ 의 [최초의 1]의 위치는  $k_1$ 보다 크기 때문이다. (따라서, 이제  $r$ 에 관한(또는  $m$ 에 관한) 귀납법이 가능하다.)

[Step 4] 앞 [Step 3]를 이용하는 귀납법과 [Step 2]에 의해,  $R, S$ 의 [최초의 1]의 위치  $k_1, \dots, k_r$ 은 모두 같다.

[Step 5]  $[R]_1 = [S]_1$ 이다. 이를 증명하기 위해

$$[R]_1 = b_1[S]_1 + b_2[S]_2 + \cdots + b_r[S]_r$$

이라고 하자(단,  $b_1, \dots, b_r \in F$ ). 먼저 이 식 양변의  $k_1$ -좌표를 비교하면  $1 = b_1$ 임을 알 수 있다. 그리고,  $1 < i \leq r$ 일 때, 이 식 양변의  $k_i$ -좌표를 비교하면 — [Step 4]에 의해  $[R]_1$ 의  $k_i$ -좌표는 0이므로 —  $0 = b_i$ 인 것도 알 수 있다.

[Step 6] 이제 [Step 3]의 귀납법을 다시 사용하면, [Step 5]에 의해,  $R = S$ .  $\square$

**주의 9.** 논리적으로는 정리 7.4.3 (minimal polynomial의 존재와 유일성)이 관찰 7.4.2보다 먼저 다루어져야 할 것이다.

**주의 10.** 연습문제 10.1.8에서  $i$ 는 index. (즉,  $i \neq \sqrt{-1}$ .)

**추가 11.** 연습문제 11.7.7(마)항 추가;  $|x| = n$ 이면,  $[x^a = x^b$  if and only if  $a \equiv b \pmod{n}]$ .

**주의 12.** 연습문제 12.3.23(나)항은 §12.5를 공부한 후에 풀 수 있다.

## 정오표

- p. 6, 1 행;  $A \in \mathfrak{M}_{n,n}(F) \rightarrow A, B \in \mathfrak{M}_{n,n}(F)$ .
- p. 40, 7 행; 모든 finite subset  $\rightarrow$  모든 (non-empty) finite subset.
- p. 45, 밑 10 행;  $(j = 1, \dots, n) \rightarrow (i = 1, \dots, n)$ .
- p. 46, 12 행;  $w_j = \sum_j \rightarrow w_j = \sum_i$ .
- p. 101, 밑 12 행; 위 (다-ii)를 (나)항의  $\rightarrow$  위 (나-ii)를 (가)항의.
- p. 109, 6 행;  $[(3) \Leftrightarrow (6)] \rightarrow [(6) \Leftrightarrow (9)]$ .
- p. 122, 6 행, 밑 5 행, 밑 4 행;  $Y_n \rightarrow Y_m$ .
- p. 122, 밑 2 행;  $(n - r) \rightarrow (m - r)$ .
- p. 124, 12 행;  $V \times \dots V \rightarrow V \times \dots \times V$ .
- p. 126, 밑 4 행;  $\mathbf{e}_3) \rightarrow \mathbf{e}_3|$ .
- p. 133, 2 행;  $S_n \rightarrow A_n$ .
- p. 139, 4 행; matr $x \rightarrow$  matrix.
- p. 145, 2 행;  $a_{n1} \rightarrow a_{2n}$ .
- p. 147, 9 행;  $\widehat{A}_{ik} \rightarrow \widehat{A}_{ij}$ .
- p. 147, 12 행;  $D^i(A) \rightarrow D_i(A)$ .
- p. 150, 아래쪽  $(n + 1) \times (n + 1)$ -행렬의 first row  $(1, a_0, \dots, a_0^n)$  빠졌음.
- p. 151, 15 행;  $x_i \rightarrow x_j$ .
- p. 153, 註;  $A\mathbf{e}_j = \sum_{i=j}^n a_{ij}\mathbf{e}_i \rightarrow A\mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^j a_{ij}\mathbf{e}_i$ .
- p. 161, 7 행;  $0 \neq v \in F \rightarrow 0 \neq v \in V$ .
- p. 163, 정리 7.1.18; 모든 non-constant polynomial  $f(t) \dots\dots$ .
- p. 165, 관찰 7.2.4;  $[L]_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}$  가 diagonalizable  $\rightarrow [L]_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}$  가 diagonal.
- p. 167, 2 행; 이 식의 계속  $\rightarrow$  이 식에 계속.
- p. 173, 밑 1 행;  $0 \neq a \in F \rightarrow a \in F$ .
- p. 174, 1 행;  $m_A \rightarrow m_T$ .
- p. 180, 4 행;  $i = 1, \dots, k \rightarrow i = 1, \dots, k$ .
- p. 193, 14 행 등 여러 곳;  $(A^2 - 2A - 2) \rightarrow (A^2 - 2A - 2I)$ .
- p. 201, 16 행;  $\deg(m_A) \rightarrow \deg(m_T)$ .
- p. 202, 연습문제 8.5.6 에서  $\psi(t)$  는 monic.
- p. 206, 밑 11 행;  $p(t)^{r_{ij}} \rightarrow p_i(t)^{r_{ij}}$ .

- p. 213, 밑 10 행; orthogonal  $\dots\dots$  부분공간들만  $\rightarrow S^\perp$  를 생각할 때는  $S$  가  $\mathbb{R}^n$  의 부분공간인 경우만.
- p. 218, 13 행; 를 고정하면  $\rightarrow$  의 원소를 모두 고정하면.
- p. 220, 7 행; motovation  $\rightarrow$  motivation.
- p. 224, 밑 7 행;  $L \in \mathfrak{M}_{n,n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathfrak{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ .
- p. 232, 질문 9.5.5;  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^2$ .
- p. 243, 밑 9 행;  $\langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle \rightarrow \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$ .
- p. 244, 밑 5 행;  $\mathbb{R}^2$  의 새로운  $\rightarrow V$  의 새로운.
- p. 249, 14 행;  $\frac{1}{\sqrt{12}} \rightarrow \sqrt{12}$ .
- p. 250, 11 행;  $n \rightarrow \dim V$ .
- p. 258, 7 행; 먼저  $[(v-w) \rightarrow$  먼저,  $w$  를 위와 같이 놓으면,  $[(v-w)$ .
- p. 266, 註 26 번; 따름정리 10.6.4  $\rightarrow$  따름정리 10.6.5.
- p. 269, 6 행;  $\delta_{ij} \rightarrow \delta_{jk}$ .
- p. 269, 15 행;  $\mathfrak{M}_{n,n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathfrak{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ .
- p. 272, 아래쪽  $(n+1) \times (m+1)$ -행렬의 first row  $(1, a_0, a_0^2, \dots, a_0^m)$  빠졌음.
- p. 273, 9 행 및 밑 4 행; 관찰  $\rightarrow$  명제.
- p. 274, 밑 6 행; 따라서,  $A$  가  $\rightarrow$  따라서,  $m \geq n$  일 때,  $A$  가.
- p. 278, 밑 2 행; (군2)  $\rightarrow$  (군3).
- p. 279, 밑 8 행; 부르고  $\rightarrow$  부르고.
- p. 287, 밑 5 행; 의 세가지  $\dots\dots$  세번째  $\rightarrow$  을 비롯한 네가지 가능성뿐임을 알 수 있다 (지면 관계로 하나는 생략). 독자들은 두번째와 세번째 그리고 생략된 네번째.
- p. 291, 밑 4 행;  $V \rightarrow G$ .
- p. 293, 밑 5 행; (나)  $\rightarrow$  (다).
- p. 303, 5 행;  $n < \infty$  일  $\rightarrow n$  (단,  $n$  은 자연수) 일.
- p. 323, 4 행;  $x, y \rightarrow x \neq y$ .
- p. 326, 1 행; patition  $\rightarrow$  partition.
- p. 344, 6 행;  $\varphi$  의 역함수  $\rightarrow \bar{\varphi}$  의 역함수.
- p. 345, 보기 12.5.6;  $n \geq 2$ .
- p. 352, 16 행; 연습문제를  $\rightarrow$  관찰을.
- p. 356, 9 행;  $(3 \times 3)$ -행렬들에서  $\lambda_i \rightarrow *$ .
- p. 356, 밑 7 행;  $a_1 \rightarrow a_0$ .

- p. 377, 밑 7 행, 밑 5 행  $\mathbb{Z}_2 \longrightarrow \mu_2$ .
- p. 381, 밑 6 행; (다)  $\longrightarrow$  (나).
- p. 391, 10 행;  $\mathfrak{L}(W, V) \longrightarrow \mathfrak{L}(W^*, V^*)$ .
- p. 394, 11 행;  $V^{**} \longrightarrow V^*$ .
- p. 395, 5 행;  $W \longrightarrow V$ .
- p. 399, 연습문제 14.8.7 과 연습문제 14.8.8 에서  $B$  는 non-degenerate.
- p. 402, 밑 6 행;  $T \longrightarrow L$ .
- p. 405, 10 행;  $\mathfrak{L}(V, V) \longrightarrow \mathfrak{L}(V, W)$ .
- p. 410; 연습문제 15.1.8;  $J$  는 가역이라고 가정.
- p. 410,; 15.1.10(가)  $\longrightarrow$  15.1.10.
- p. 417, 12 행;  $[B]_{\mathfrak{B}} \longrightarrow [H]_{\mathfrak{B}}$ .
- p. 417, 밑 2 행; 14.9.3  $\longrightarrow$  14.9.4.
- p. 420, 밑 5 행 (두 곳); geomtery  $\longrightarrow$  geometry.
- p. 425; 관찰 16.1.4 증명;  $B, H$  를  $\langle, \rangle$  로 표기.
- p. 428, 밑 7 행; hyphothesis  $\longrightarrow$  hypothesis.
- p. 429, 8 행;  $D_n(F) \longrightarrow D_n(\mathbb{C})$ .
- p. 441, 18 행, 19 행 (세 곳);  $B \longrightarrow H$ .
- p. 448, 5 행; openness  $\dots\dots$  등은  $\longrightarrow$  boundedness 가.